

Lægerne i Gothersgade

Test for mavesårsbakterie (Helicobacter Pylori)

Redigeret 18. september 2016

Ved pustepróven kan man bestemme, om bakterien Helicobacter Pylori er til stede i mavesækken eller tolvfingertarmen. Har man bakterien i mavesækken, kan det give hyppige sure opstød, halsbrænd, smerter i øvre del af maven og i værste tilfælde mavesår. Bakterien kan fjernes fra mavesæk og tolvfingertarm med antibiotika og syredæmpende medicin.

Forberedelse:

Du må ikke drikke eller spise i de sidste 6 timer før undersøgelsen. Indtag af 1-2 glas vand er tilladt. Antibiotikabehandling skal været stoppet mindst 4 uger før undersøgelsen

Brug af mavesårsmedicin (syrepumpehæmmere) f.eks. Omeprazol, Esomeprazol, Lansoprazol eller Pantoprazol skal være stoppet mindst 2 uger før undersøgelsen.

Du må ikke have taget syreneutraliserende medicin f.eks. Alminox, Link, Balancid, Samarin, Novaluzid, Noacid eller Magnesia, i de sidste 6 timer før undersøgelsen.

Undersøgelsen

Selve undersøgelsen foregår hos sygeplejersken. Du skal puste i et rør og skal derefter drikke en væske og puste igen. Undersøgelsen tager ca 40 minutter.

Efter undersøgelsen

Vi har svar på undersøgelsen efter ca 2 uger.

Du kan maile eller ringe og få svaret, men ønskes en videre handlingsplan anbefaler vi, at du får en tid hos din læge. Det kan derfor være en god ide at bestille en tid til svar allerede den dag, du får lavet pustepróven.